



Sanitační plán pro chov prasat

Stáje pro prasnice:

PORODNÝ: mezi turnusy

- Mechanická očista
- Umytí detergentem Biosolve Plus v koncentraci 0,5-1% po 20 – 60 minutách mytí tlakovou vodou a oplach
- Za 1-5 hodin po oplachu aplikace 0,5-1% roztoku Virkon S postřikem 300 ml/m² (střídavě s aplikací 0,5-1% roztoku Virkon Advanced)
- Porodní kotce ošetřit 2% roztokem Kilcox Extra (prevence kokcidiózy selat)
- Březí prasnice před přesunem na porodnu omýt a dezinfikovat povrch těla 0,5% roztokem přípravku Virkon S
- 24-48 hodin před naskladněním prasnic na porodnu provést prostorovou dezinfekci fogováním (Virkon S)

za přítomnosti zvířat

- 1 x týdně fogování (0,5% Virkon S) první fogování provést po ukončení porodů

JALOVÉ A BŘEZÍ: mezi turnusy

- Mechanická očista
- Umytí detergentem Biosolve Plus (Ecofoam Extra) v koncentraci 0,5-1% po 20 – 60 minutách mytí tlakovou vodou a oplach
- Za 1-5 hodin po oplachu aplikace 0,5-1% roztoku Virkon S postřikem 300 ml/m²
nebo
- Teplé měsíce roku (nad 10°C): Za 1-5 hodin po oplachu aplikace 1% roztoku Ambicide (Sanita Forte Vet, Virofog) postřikem 300 ml/m²
- Studené měsíce roku (pod 10°C): Za 1-5 hodin po oplachu aplikace 1% roztoku HPPA
- Nebo kontinuální provozy celoročně 0,5% roztok Virkonu S za přítomnosti zvířat v sousedních kotcích

Stáje pro kance:

- Mechanická očista
- Umytí detergentem Biosolve Plus v koncentraci 0,5-1% po 20 – 60 minutách mytí tlakovou vodou a oplach
- Za 1-5 hodin po oplachu aplikace 1% roztoku Virkon S postřikem 300 ml/m²

Stáje pro selata a výkrm:

PŘEDVÝKRM: mezi turnusy

- Mechanická očista
- Umytí detergentem Biosolve Plus v koncentraci 0,5-1% po 20 – 60 minutách mytí tlakovou vodou a oplach
- Za 1-5 hodin po oplachu aplikace 1% roztoku Virkon S postřikem 300 ml/m² (střídavě s aplikací 0,5-1% roztoku Virkon Advanced)

za přítomnosti zvířat

- 1 x týdně fogování (0,5% Virkon S)

VÝKRM: mezi turnusy

- Mechanická očista
- Umytí detergentem Ecofoam Extra v koncentraci 0,5-1% po 20 – 60 minutách mytí tlakovou vodou a oplach
- Teplé měsíce roku (nad 10°C): Za 1-5 hodin po oplachu aplikace 1% roztoku Ambicide (Sanitas Forte Vet, Virofog) postřikem 300 ml/m²
- Studené měsíce roku (pod 10°C): Za 1-5 hodin po oplachu aplikace 1% roztoku HPPA
- Nebo celoročně 1% roztok Virkon S

Dezinfekce napájecího systému a vody:

Aplikace přípravku Virkon S v 0,5% koncentraci. Naplnit systém dezinfekčním roztokem, nechat minimálně 1 hodinu působit a propláchnout.

Dezinfekce vody k napájení aplikací přípravku Virkon S v 0,1% koncentraci.

Dezinfekce rukou personálu:

Po umytí nanést na suchou pokožku přípravek Rely+On Antiseptic gel, rozetřít a nechat zaschnout.

Dezinfekční bariéry pro dezinfekci obuvi mezi sekcemi:

1% roztok Virkon S (nebo 1% roztok Virkon Advanced) po dobu 5-7 dní, v případě silného znečištění vyměnit ihned.

Dezinfekční bariéry pro vozidla na vstupu do chovu:

1% roztok Virkon Advanced po dobu 5-7 dní, v případě silného znečištění vyměnit ihned.

Plynování zásobníků krmiva (sil):

Aplikace přípravku Paraform Prills v dávce 320 g / 100 m³ 1 x za 3 měsíce.

Pravidelné provádění účinné deratizace.